

Ce que nous savons

Le VIH/sida fait encore des ravages. Selon le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. On estime à 30% le nombre de personnes infectées par le VIH qui ignorent qu'elles le sont.

VIH



Information




Importante



Pour une personne séropositive. Avoir des relations non protégées représente des risques de contracter d'autres infections qui ont des conséquences importantes.

Les ITSS, telles que la SYPHILIS, la LGV ou l'Herpès, peuvent entraîner chez une personne séropositive des symptômes et des complications plus marqués que chez une personne séronégative.

SYPHILIS



LGV



ITSS

? RESSOURCES ?

- Près chez-vous CLSC.
- Les cliniques médicales.
- Le médecin de famille.

www.sero-zero.qc.ca

SÉRO ZÉRO

Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320

Montréal (Québec) H2L 2Y4

Courriel: intervention@cssq.org

Téléphone ATS: 1-877-535-5556

Télécopieur / voix : (514) 521-1137

Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511



Partenaire: SÉRO ZÉRO

Réalisation: **Éric Dubé**

Conception: **Michel Turgeon**

Figurants: **Éric Dubé et Annik Boissoneault**

Merci à tous les bénévoles !

Le Barebacking





La production de cette ressource a été rendue possible grâce à la collaboration financière de l'Agence de Santé Publique du Canada


Qu'est-ce le Barebacking ?

Le barebacking se traduit par un choix délibéré et assumé par des hommes qui pratiquent la pénétration anale active ou passive. Avec un partenaire de statut sérologique inconnu (ne le sait pas s'il est séropositif ou séronégatif).


Barebacking



En connaissance des risques auxquels ils s'exposent. Il est pratiqué par les hommes **séropositifs** ou des hommes qui assument entièrement **le risque de le devenir**.




Séronégative



Séropositive

Transmission



Pour que le barebacking ne présente aucun danger, il faut qu'aucun des deux partenaires ne soit pas infecté par le VIH ou par une autre infection transmissible sexuellement (ITS).

Dans tous les autres cas, le barebacking expose les deux partenaires à un risque élevé (plus) d'infection par le VIH et d'autres ITS.

Utilisation des condoms

Seul un condom de bonne qualité (qui ne déchire pas et ne laisse pas passer les micro-organismes par sa minceur) et lubrifié (on peut aussi utiliser un lubrifiant non gras en complément) qui est correctement employé garantit une protection efficace.

Même entre deux partenaires séropositifs, il importe d'utiliser un condom, car les infections répétées par le VIH ou les surcontaminations (par le VIH ou d'autres germes ou micro-organismes) peuvent accélérer l'apparition de la maladie.

Avec condom moins risqué

